




mądra opieka
na całe życie

W jaki sposób działają immunoglobuliny dożylne (IVIg)?

IVIg, z ang. intravenous immunoglobulin.
Grafiki akcesoriów i urządzeń do infuzji są przykładowe.

Immunoglobuliny




Osoby cierpiące na choroby układu odpornościowego, które wynikają z defektu produkcji przeciwciał, mogą być leczone immunoglobulinami.

Wyróżnia się 3 drogi podawania preparatów immunoglobulin:

- podskórna wspomagana hialuronidazą,**
- podskórna konwencjonalna,**
- dożylna**


Podczas podania immunoglobuliny drogą dożylną zawsze obecna jest pielęgniarka.



Igła wprowadzana jest w żyłę przedramienia.




Immunoglobuliny dostarczane są do organizmu dzięki infuzji.



Immunoglobuliny trafiają bezpośrednio do krwiobiegu, a stamtąd są transportowane do pozostałej części organizmu.

Infuzja dożylna zajmuje od 2 do 3 godzin, ale jej długość różni się w zależności od dawki i szybkości podania.



Chociaż immunoglobuliny wspomagają ochronę przed drobnoustrojami, mogą również spowodować, że podczas i po podaniu może być odczuwalny dyskomfort. Są to tzw. działania niepożądane.

Przykładowo można odczuwać ból głowy lub nudności.




Ból głowy




Nudności

Ponieważ u osób cierpiących na zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego, z czasem ilość immunoglobulin we krwi zmniejsza się, konieczne jest ich regularne podawanie.




Terapię dożylną przyjmuje się regularnie w szpitalu i jest ona podawana przez pielęgniarkę.




Raz na 3 do 4 tygodni

Terapia dożylna stosowana jest zazwyczaj raz na 3 do 4 tygodni.



Należy wspólnie z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką zdecydować, który sposób podania będzie dla pacjenta najlepszy.



mądra opieka
na całe życie

Informacje opracowano na podstawie: 1. https://immunoprotect.pl/wp-content/uploads/2013/08/POPL_Osoczopochodne.pdf, dostęp 01/2022. 2. Charakterystyki Produktów leczniczych zawierających Immunoglobulinum humanum normale, <https://rejstrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public>, dostęp: 01/2023.

Niniejszy materiał nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej.
W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.
Materiał przeznaczony dla pacjentów i szerokiej publiczności, przygotowany i sponsorowany przez Takeda, C-ANPROM/PL/IG/0238, 01/2023.
Copyright © 2023 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki handlowe są własnościami ich prawowitych właścicieli.

Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68 00-838 Warszawa, Polska, telefon: +48 22 608 13 00
lub 01 Fax +48 22 608 13 03, www.takeda.com/pl-pl/